PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA CON MOVIPREP[©]

<u>CONTROINDICAZIONI</u>: non somministrare MOVIPREP[©] a pazienti affetti da **fenilchetonuria** (è presente aspartame) e **favismo** (carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi, è presente acido ascorbico/ascorbato

MODALITA' DI PREPARAZIONE

Una preparazione corretta comporta l'assunzione di 2 litri di MOVIPREP[®] (reperibile in farmacia). La confezione contiene 2 buste trasparenti contenente ciascuna una bustina grande A ed una bustina piccola B. Un litro di Moviprep si prepara mescolando insieme in 1 litro di acqua una bustina A ed una bustina B fino al completo scioglimento (soluzione limpida). La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti). Ripetere l'assunzione con un secondo litro di Moviprep preparato nello stesso modo. Per completare la preparazione è necessario bere anche 1 litro di liquidi chiari, tra cui acqua the o camomilla.

DIETA (solo per pazienti con STIPSI)

- 1. iniziare la dieta tre giorni solari prima dell'esame.
- 2. i primi due giorni seguire una dieta priva di scorie, cioè SENZA pasta, riso, pane, verdura, frutta (sono concesse spremute filtrate di agrumi o gelatine di frutta).
- 3. si potranno assumere a volontà: carne, salumi, pesce, uova e latticini.
- 4. il terzo giorno (quello che precede l'esame), a colazione e a pranzo assumere, esclusivamente liquidi (es.: tè, latte, caffè, liquidi zuccherati, brodo...).
- 5. nel pomeriggio assumere la soluzione di MOVIPREP come specificato di seguito, quindi NON ASSUMERE più alcun alimento sino all'esecuzione dell'esame, salvo acqua.

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Per ottenere una buona pulizia dell'intestino possono essere eseguite due diverse modalità di assunzione, in funzione delle esigenze del paziente e dell'orario di effettuazione della colonscopia.

1) Assunzione unica (raccomandata per la colonscopia al mattino)

- Il giorno precedente l'esame il <u>pranzo</u> non deve comprendere pane, pasta, frutta e verdura (si possono assumere carne e/o pesce e/o formaggi); la <u>cena</u> deve essere costituita esclusivamente da liquidi (acqua, tè, latte, ecc..) con zuccheri a volontà.
- L'assunzione richiede in totale 2-3 ore e viene effettuata nel tardo pomeriggio del giorno precedente l'esame (dalle ore 17.00-18.00 circa in poi).
- Si consiglia di bere ogni 15-20 minuti 250 ml di soluzione, sino ad assumere i 2 litri di Moviprep totali.
- <u>E' obbligatorio bere 1 litro di acqua</u> (o in alternativa the, camomilla o altro liquido chiaro) dopo aver assunto i 2 litri di Moviprep; in alternativa, se è più comodo, è anche possibile bere mezzo litro di acqua dopo ogni litro di Moviprep. In totale quindi andranno assunti 3 litri: 2 di Moviprep e 1 di acqua, altrimenti la preparazione non sarà completa e l'esame non potrà venire eseguito.

2) Assunzione frazionata (raccomandata per la colonscopia al pomeriggio)

• Il giorno precedente l'esame il <u>pranzo</u> non deve comprendere pane, pasta, frutta e verdura (si possono assumere carne e/o pesce e/o formaggi); la <u>cena</u> deve essere costituita esclusivamente da liquidi (acqua, tè, latte, ecc..) con zuccheri a volontà.

L'assunzione di MOVIPREP viene suddivisa in due momenti :

a) **Giorno precedente l'esame**: nel tardo pomeriggio bere 1 litro di Moviprep entro un'ora e successivamente <u>bere mezzo litro di acqua</u> (o in alternativa the, camomilla o altro liquido chiaro). **b) Giorno dell'esame**: almeno 4 ore prima dell'esame bere ancora 1 litro di Moviprep entro un'ora e successivamente <u>bere ancora mezzo litro di acqua</u> (o in alternativa the, camomilla o altro liquido chiaro).

Non ingerire alcun tipo di cibo solido né prima (3-4 ore) né durante l'assunzione della soluzione né nell'intervallo fra la fine dell'assunzione della soluzione e l'esame endoscopico. <u>Assuma ugualmente tutti i farmaci abituali</u>, fino alla mattina dell'esame.